



بیمارستان شریعتی



شناسنامه آموزشی

عنوان: واکسیناسیون

نهییه کننده: سوپروایزر آموزش سلامت

تایید کننده: کمیته آموزش به بیمار

ناظر کیفی: دکتر معظمی گودرزی

سال تهیه: تابستان 1400

کد: 00/SH/PA/EP/97

منع واکسن:

کودکانی که مبتلا به زردی هستند و ای وی ای جی را دریافت کردند تا 8 ماه نمی توانند هیچ واکسنی بجز قطره فلج اطفال دریافت کنند. در صورت داشتن سابقه تشنج واکسن سیاه سرفه را نباید دریافت کنند. در صورت دریافت خون تا 5 ماه و در صورت دریافت پلاکت یا پلاسما تا 7 ماه نباید واکسن زنده ضعیف شده را دریافت کنند.

منبع: نلسون و کتاب کمیته کشوری

نقش مهم والدین در واکسیناسیون فرزندان

والدین به هیچ عنوان نباید از خشونت در هنگام واکسیناسیون در جهت مهار کودک استفاده کنند. مادر با کودک خود تماس پوستی برقرار کند، او را در آغوش بگیرد و کودک خود را بعد واکسیناسیون نوازش کند. هیچگاه کودک خود را به آمپول یا واکسن تهدید نکنید. در صورت قرمزی محل واکسن از کمپرس سرد و در صورت سفتی محل تزریق از کمپرس گرم استفاده کنید. و در صورت تب و جلوگیری آن روز اول هر 4 ساعت 2 برابر وزن کودک قطره استامینوفن و روز دوم هر 6 ساعت بدهید. استحمام محل واکسیناسیون منعی ندارد. از پوشاندن لباس تنگ به خصوص محل تزریق پرهیز کنید.

نکات

مهم

واکسیناسیون

باورهای
غلط در مورد
ممنوعیت
واکسیناسیون



جدید ترین برنامه واکسیناسیون کشوری
کودکان

1) واکنش های حساسیتی (شوک آنافیلاکسی) به ندرت رخ میدهد بعد تزریق واکسن و در صورت ایجاد شوک به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه کنید

2) در کودکان مبتلا به ایدز و نقص ایمنی نباید واکسن فلج اطفال صورت بگیرد

3) در صورت استفراغ در کمتر از 10 دقیقه پس از دریافت قطره فلج اطفال بایستی تجویز قطره تکرار شود

4) در صورت سفتی شدید عضله یا تخریب عضله حتما مراجعه کنید

5) در صورت ایجاد علائم مثل کپیر، خارش، تنگی نفس و تورم صورت و یا بدن سریع به اولین مرکز درمانی مراجعه کنید

- 1) تماس خانگی با خانم باردار
- 2) نارس بودن یا کم وزن بودن شیر خوار
- 3) ابتلا به بیماری عفونی در چند مدت اخیر
- 4) مصرف آنتی بیوتیک
- 5) دوره نقاهت یک بیماری
- 6) بیماری یا تب خفیف
- 7) ابتلا به زردی و سوتغذیه
- 8) سابقه سندرم مرگ ناگهانی
- 9) در تماس با فرد نقص ایمنی
- 10) سابقه جراحی
- 11) داشتن بیماری مزمن غیر واگیر
- 12) تغذیه با شیر مادر

توجه: شرایط فوق دلیلی بر ممنوعیت تزریق واکسن نیست و نیازی به تعویق انداختن ایمن سازی نمی باشد.

نام واکسن	زمان تلقیح
فلج اطفال خوراکی / ب.ث.ژ / هیپاتیت B	بدو تولد
فلج اطفال خوراکی	2 ماهگی
فلج اطفال خوراکی و تزریقی	4 ماهگی
فلج اطفال خوراکی و تزریقی	6 ماهگی
سرخک، سرخجه و اوریون (MMR)	12 ماهگی
سه گانه / فلج اطفال خوراکی / MMR	18 ماهگی
سه گانه / فلج اطفال خوراکی	6 سالگی