

۵ عمل

کورتاژ تشخیصی (D&C) (

یکی از روش های رایج برای کنترل خندریزی های غیرطبیعی رحمی و به دست آوردن نمونه کافی از آندومتر جهت بررسی های پاتولوژی است .

موارد انجام دادن

کورتاژ تشخیصی

۱- خونریزی های غیر عادی مخصصا وقتی به درمان های دارویی پاسخ نمی دهد .

۲- خونریزی رحمی بعد از یائستگی

۳- جراحی واژینال

برای انجام این عمل باید از شب قبل ناشتا باشید. در بعضی مواقع

صبح روز عمل یک قرص درد داخل رحم شما قرار می دهند که ممکن است دردی شبیه درد زمان

پریودی در شما ایجاد می شدد و یا خونریزی شما افزایش یابد که این حالت طبیعی می باشد .

بیهوشی حین عمل

در حین انجام عمل بیهوشی عمومی مختصری به شما داده می شود. نمونه ای که از شما گرفته شده به واحد پاتولوژی ارسال می شود و رسید آن را تحویل شما می دهند .

بعد از عمل ممکن است حالت تهوع داشته باشید که به علت داروهای بیهوشی می باشد

.تازمان هوشیاری کامل از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید

و از چند ساعت بعد در صورت نداشتن تهوع میتوانید رژیمی راکه در منزل داشتید ادامه بدهید. معمولا عصر روز عمل ترخیص می شوید. .

توصیه های پس از ترخیص


❖ آنتی بیوتیک و داروهای تجویز شده را به طور کامل و به موقع استفاده کنید.

❖ در روز عمل از فعالیت های سنگین بپرهیزید و پس از آن فعالیت عادی داشته باشید .

❖ از شنا کردن ، حمام کردن داخل واژن



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان



تهیه کننده: پروانه جعفری

تایید کننده: کمیته آموزش به بیمار

ناظر کیفی: سوپر وایزر آموزش سلامت

با تایید خانم دکتر آزاد

سال ۱۴۰۳

وتب نشانه عفونت می باشد. لطفاً سریعاً به پزشک مراجعه نمایید

❖ حدود سه هفته بعد جوا ب پاتولوژی جراحی که رسید آن به شما داده شده را از بیمارستان دریافت کرده و به مطب پزشک خود مراجعه نمایید

- ❖ از نزدیکی به مدت ۱ الی ۱۲ روز پرهیزید.
- ❖ یک روش مطمئن برای جلوگیری از بارداری داشته باشید.
- ❖ اگر میزان خونریزی شما در حده بینی باشد طبیعی است ولی اگر از زمان پریودی شما بیشتر باشد و یا مدت آن طولانی شود حتماً به پزشک مراجعه کنید.
- ❖ بهداشت فردی خود را رعایت کنید. از لباس زیر نخی استفاده کنید و روزانه لباس زیر خود را تعویض نمایید
- ❖ وجود درد در زیر شکم یا ترشحات چرکی یا خونابه ای بدبو