

بسمه تعالی

تیروئید در نوزادان

بیمارستان و زایشگاه دکتر

علی شریعتی

بخش جراحی



تیروئید در نوزادان:

غده تیروئید در هفته ۴-۱۰ جنینی تکامل یافته و در جلوی گردن مستقر میشود. وجود اختلال در تشکیل ویا در مسیر حرکت بافت تیروئید میتواند باعث عدم تشکیل و تشکیل ناقص و یا قرارگیری غده تیروئید در محل نا بجا گردد.

کم کاری مادر زادی

تیروئید:

کم کاری تیروئید

مادرزادی گذرا: علت اصلی

بروز این بیماری

\*داروهای پرکاری ضد

تیروئید توسط مادر در طول

دوران بارداری توسط مادر

\*کمبود ید

\*در معرض موادی که ید

بالای دارند

\*مصرف داروهای که بخاطر بیماری خود ایمنی غده تیروئید جهت درمان کم کاری تیروئید به مادر تجویز شده اند.

علائم بالینی کم کاری

تیروئید در نوزادان:

\*پف کردن صورت و متورم شدن زبان

\*گریه با صدای خرخر و گرفته

\*سردی نقاط انتهایی بدن و لکه دار شدن پوست

\*فتق ناف

\*رشد ضعیف یا توقف رشد

\*زردی به مدت طولانی

\*بزرگ شدن جمجمه

\*بنیه ضعیف در شیر خوار

غربالگری تیروئید در

نوزادان:

روز ۳ تا ۵ بعد از تولد مراکز بهداشت نزدیک منزل می باشد.

کد پمفلت:

1403/SH/PA/EP/191

سوپروایزر آموزش سلامت

ناظر کیفی کمیته آموزش بیمار

بهار ۱۴۰۳

منبع: واحد تحقیق و توسعه  
آزمایشگاه نوبل

عوارض پر کار پر تیروئید:

\* اختلال در رشد جسمی

\* بروز عقب ماندگی ذهنی

\* ایجاد بیماری‌های قلبی در نوزادان

درمان:

\* اگر خفیف باشد نیازی به در مان

نیست در پر کار پر تیروئید

تجویز داروهای جایگزین هورمون تیروئید

۴۵ به شکل قرص عرضه میشود .

تست های لازم جهت تشخیص

عارضه تیروئید در نوزادان:

TSH\*

free T4\*

در کار پر تیروئید در

نوزادان:

\* تغییر رنگ پوست نوزاد

\* تعادل کمتری به شیر خوردن

\* درجه حرارت و تب زیاد

\* ضربان قلب بالا یا قلب

\* تولد زود رس نوزاد

\* لرزش دست و ضعف

\* بزرگی یودن تیروئید